

Oblast použití		Četnost	Způsob	Dezinfekční prostředek		Koncentrace	Expoziční doba	Spektrum účinnosti	Pozn.	
Ruce	hygienická dezinfekce rukou	po manipulaci s kontaminovaným materiálem, prádlem, po a před ošetrovacími výkony	vtírat do suchých rukou po předepsanou dobu, udržovat vlhké (dle metodického pokynu pro dezinfekci rukou)	SKINMAN SOFT	alkohol, KAS	neředí se, 3ml	30 s	A(B)TMV	plně virucidní za 2 min	
				SKINMAN SOFT PROTECT	alkohol	neředí se, 3ml	20 s	A(B)TMV		
				STERILLIUM	alkohol	neředí se, 3ml	30 s	A(B)TMV		
				STERILLIUM CLASSIC PURE	alkohol	neředí se, 3ml	30 s	A(B)TMV		
	chirurgická dezinfekce rukou	před operačním výkonem rozotírat na rukou a předloktí		SKINMAN SOFT	alkohol, KAS	neředí se, 2x 5ml	3 min	A(B)TMV	plně virucidní za 2 min	
				SKINMAN SOFT PROTECT	alkohol	neředí se, 2x 5ml	1,5 min	A(B)TMV		
				STERILLIUM	alkohol	neředí se, 2x 5ml	1,5 min	A(B)TMV		
				STERILLIUM CLASSIC PURE	alkohol	neředí se, 2x 5ml	1,5 min	A(B)TMV		
Pokožka	dezinfekce pokožky	před vpichy a invazivními výkony, odběry krve, operační pole	dezinfekce postříkem nebo pomocí sterilního tamponu	SKINSEPT F - bezbarvý	alkohol, chlorhex.	neředí se	Vpichy 15 s, punkce, operační pole 1 min. Musí zcela zaschnout.	A(B)TMV		
				CUTASEPT F - bezbarvý	alkohol	neředí se		A(B)TMV		
				SKINSEPT G, CUTASEPT G barevný	alkohol	neředí se		A(B)TMV		
	sliznice, antiseptické oplachy	před cévkováním, výplachy sliznice úst, dekolonizace MRSA, aj.	smočit postříkem nebo pomocí sterilního tamponu	SKINSEPT MUCOSA	chlorhex., etanol, peroxid vodíku	neředí se	1 min	A(B)V		
		dezinfekce pokožky, výplachy ran, bércových vředů, aj.		BRAUNOL, VIDENE	PVP- jód	konc., případné ředění dle výrobce	1 min	A(B)TMV		
	celotělová dekolonizace pacientů v případě zjištění MRSA, před chirurgickými výkony	dekolonizace a mytí těla a vlasů pacientů	nanést na navlhčenou pokožku a vlasy, nechat působit, opláchnout	SKINMAN SCRUB	triclosan	neředí se, 3ml	1 min	A(B)V		
		dekolonizace sliznic dutiny ústní	vyplachovat ústní dutinu, kloktat	SKINSEPT MUCOSA	chlorhex., etanol, peroxid vodíku	neředí se	1 min	A(B)V		
	Nástroje a pomůcky	dekontaminace chirurgických nástrojů, ostatních nástrojů a pomůcek z plastu, pryže, skla, apod.	vždy po použití vložit do připraveného dezinfekčního roztoku	zcela ponořit do připraveného roztoku, dutiny vyplnit roztokem, po uplynutí expozice dočistit, opláchnout pitnou vodou, osušit, termostabilní nástroje a předměty sterilizovat, termolabilní podobit vyššímu nebo druhému stupni dezinfekce	SEKUSEPT AKTIV	kyslík	1%	15 min	A(B)TMV	
CHIROSAN PLUS					kyslík	0,5-1%	60-15 min	A(B)TMV		
KOHRSOLEX med AF					amin	1%	15 min	A(B)		
SEKUZYME					enzym	1%		enzym		
emitní misky, podložní misky, močové lahve		vždy po použití vložit do připraveného dezinfekčního roztoku, před dezinfekcí odstranit hrubé nečistoty	zcela ponořit do připraveného roztoku, po uplynutí expozice dočistit, opláchnout pitnou vodou, osušit	MEDICARINE	chlór	2tb/10l	30 min	ABTMV		
				INCIDIN RAPID	aldehyd	0,5%	30 min	A(B)TMV		
druhý (ABTMV) a vyšší stupeň (ABCTMV) dezinfekce	pomůcky a nástroje, které nelze sterilizovat po dekontaminaci	po dekontaminaci a vysušení zcela ponořit do pracovního roztoku a po expozici opláchnout čistou (DSD)/sterilní (VSD) vodou	SEKUSEPT AKTIV	kyslík	2%	10-15 min	ABTMV-ABCTMV			
uchování podávek	po použití vždy vložit do připraveného dezinfekčního roztoku	výměna roztoku min. 1 x za 12 hodin nebo dle potřeby	SEKUSEPT PLUS	amin	3,0%		konzervační roztok			
Plochy	podlahy, stoly, nábytek, okenní parapety, postele, lehátka, transportní vozíky, nádoby na odpad a jiné povrchy	operační sály: před začátkem operačního provozu a vždy po každém pacientovi, JIP 3 x denně, vyšetřovny, lůžkové pokoje, pracovní lékářů a sester. 2xdenně, chodby: 1xdenně nebo dle provozního řádu oddělení	mytí s dezinfekčním účinkem (kumulativní efekt) pracovním roztokem otřít plochy do moka a nechat zaschnout. Pro JIP, OS platí vyšší koncentrace.	INCIDIN RAPID	aldehyd, KAS	0,25-0,5%	60-30 min	A(B)V- A(B)TMV	plně viry VHA 0,5%/60	
				DESAM OX	kyslík, KAS	1-2%	30 min	A(B)TMV		
				INCIDIN EXTRA N INCIDIN PLUS	amin, KAS amin	0,25-0,5%, 0,25-0,5%	60-15 min 60-15 min	A(B)TMV A(B)TMV		
	epidemiologicky závažná situace, cílené potlačení infekce		pracovním roztokem otřít plochy do moka a nechat zaschnout	DESAM SOLID	chlórdioxid	2-4 sáčky /10l vody	15 min	ABCTMV	plně viry 0,5%/60 min clostridium diff. 2%/60 min	
				MIKASEPT KP	kys. peroctová	0,2%	15 min	ABCTMV		
				INCIDIN RAPID	aldehyd, KAS	0,5-2%	60 min	ABTMV-ABCTMV		
Malé plochy	vyšetřovací a zákrovové stoly, vozíky, instrument. stolky, lehátka, přístroje	rychlá dezinfekce postříkem	rozprašovačem nastříkat na plochy nebo předměty, netírat	INCIDIN LIQUID	alkohol	neředí se	5 min, do zaschnutí	A(B)TMV		
				INCIDIN FOAM	amin, alkohol	neředí se	1-5 min	A(B)V- A(B)TMV		
				DESPREJ SENZITIVE	alkohol + KAS	neředí se	5 min, do zaschnutí	A(B)TMV		
		rychlá dezinfekce otřením	ubrouskem otřít	SANI CLOTH ACTIVE	KAS	neředí se	1 min	A(B)		
	systém wipex- malé plochy a povrchy, povrchy přístrojů, bezdotykové teploměry, svody a sondy, dekontaminace biologického materiálu (malá množství)	rychlá dezinfekce otřením		důkladně otřít ubrouskem, nechat zaschnout. Roztok má garantovanou stabilitu 28 dní, pak zásobník vyprázdnit, vymýt a vydezinfikovat, vložit novou roli + roztok, označit název a expiraci roztoku	INCIDIN PLUS INCIDIN EXTRA N	amin amin, KAS	1,0%	15 min	A(B)TMV	30ml/3l vody
					Kohrsolin FF	aldehyd, KAS	1,0%	15 min	A(B)	90 utérek / 1 sáček /3l
Ostatní	nádobi na oddělení	dle harmonogramu práce oddělení	po umytí vložit do roztoku, po uplynutí expozice důkladně opláchnout pitnou vodou	MEDICARINE	chlór	2-3tb/10l	10 min	A(B)TMV	dle znečištění	
	sifony	prolit roztokem min. 0,5l	oddělení, ambulance 1x týdně, JIP, OS: 1x denně	MEDICARINE	chlór	1 tb/1,5l vody	30 min	ABTMV		
	plochy ve stravovacím provozu	1xdenně nebo dle provozního řádu kuchyně	pracovním roztokem otřít plochy do moka nechat působit. Plochy, přicházející do styku s potravinami pak řádně opláchnout	INCIDIN PLUS	amin	0,25%	60 min	A(B)TMV	rota virus 2%	
				DESAM OX	kyslík, KAS	1%	30 min	A(B)TMV		
				SAVO	chlór	3%	15 min	ABV		
	dezinfekce rehabilitačních van	dezinfekce rehabilitačních van	po každém pacientovi omyt, nechat působit, opláchnout pitnou vodou	potrubní systém propláchnout čistou vodou, 1. roztok nechat cirkulovat v systému při teplotě 40-60 °C, proplach pitnou vodou, následně použít roztoku 2. 40-60°C, proplach	SEKUSEPT AKTIV	kyslík	1,0%	5 min	A(B)V	
					MEDICARINE	chlór	2tb/10l	5 min	A(B)V	
					SAVAGRO K	kyselý prostředek, kys.fosforečná, kys.dusičná	0,25%	20 min	čistič	
					SAVAGRO A+	alkalický prostředek, chloran sodný, hydroxid sodný	0,25%	20 min	A(B)V	
					MEDICARINE	chlór	2tb/10l	30 min	ABTMV	

Vysvětlivky:

Účinnosť proti:

A - vegetatívnym formám bakterií a kvasinkám

B - celému spektru virů (obaleným i neobaleným)

(B) - obaleným živočíchom

C - bakteriálnym sporám

M - potenciálne patogenním mykobakteriám

T - mykobakteriim kompleksu *M. tuberculosis*

V - mikroskopickým vláknitým houbám

Pro úklid a dezinfekci používat vodu o teplotě 20 - 25°C, není - li uvedeno jinak.

Do dezinfekčních prostředků nepřidávat žádné detergenty, tensidy aj., chlórové prostředky nemíchat s kyselinami, dezinfekční prostředky nemíchat vzájemně.

platnost od 1.1.2014