

DEZINFEKČNÍ ŘÁD KLATOVSKÉ NEMOCNICE

Krajská hygienická stanice
Plzeňského kraje se sídlem v Plzni
územní pracoviště KLATOVYNemocnice
Plzeňského
kraje

Oblast použití	Indikace	Způsob	Dezinfekční prostředek	Koncentrace	Expozice	Spektrum účinnosti	Účinná látka			
Mytí rukou	špinavé ruce, po použití WC, před jídlem, před příchodem na pracoviště, před chir. dezinfekcí rukou	rozetřít s malým množstvím vody, opláchnout, osušit ruce	PROSAVON, KLEENEX	neředěný	-	-	-			
Hygienická mytí rukou, dekolonizace těla pacienta	dekolonizace pacienta osídleného MRSA či jinými multirezist. agens-1x denně, předoperační mytí těla pacienta	rozetřít s malým množstvím vody, opláchnout, osušit ruce/ opakovaně nanést na mokré vlasy a tělo, napěnit, nechat působit, po expozici opláchnout	SKINSAN SCRUB N	neředěný	1 min	A(B)(V)	chlorhexidin			
Hygienická dezinfekce rukou	před a po kontaktu s pacientem, před aseptickými výkony, po kontaktu s biologickým materiálem, po kontaktu s okolím pacienta	vtírat množství 3 ml do suchých rukou, udržovat ruce vlhké po celou dobu expozice	DESDERMAN® PURE	neředěný	30 s	A(B)TMV	etanol, propanol			
			DESMANOL® PURE	neředěný	30 s	A(B)TM(V)	isopropanol			
			SEPTODERM	neředěný	30 s	A(B)TMV	etanol, isopropanol, KAS			
			SKINMAN SOFT	neředěný	30 s	A(B)TMV	isopropanol			
			STERILLIUM	neředěný	30 s	A(B)TM(V)	isopropanol			
			KLEENEX GEL	neředěný	30s	A(B)TMV	etanol, isopropanol			
			SEPTODERM GEL	neředěný	30 s	A(B)TMV	etanol, isopropanol			
Chirurgická dezinfekce rukou	před aseptickými výkony, před operačními výkony	vtírat dostatečné množství do rukou a předloktí, udržovat je vlhké po celou dobu expozice - dle postupu pro chirurgickou dezinfekci rukou	DESDERMAN® PURE	neředěný	3 min	ABTMV	etanol, propanol			
			DESMANOL® PURE	neředěný	3 min	A(B)TM(V)	isopropanol			
			SEPTODERM	neředěný	3 min	ABTMV	etanol, isopropanol, KAS			
			SKINMAN SOFT	neředěný	3 min	A(B)TMV	isopropanol			
			STERILLIUM	neředěný	3 min	ABTMV	isopropanol			
			SEPTODERM GEL	neředěný	3 min	ABTMV	etanol, isopropanol			
			Dezinfekce kůže a operačního pole	před vpichy nebo jinými zákroky porušující integritu kůže	oblast smotit postříkem nebo pomoci sterilního tamponu	BRAUNOL, BETADINE	neředěný	1 min	ABTMV	PVP jod
CITROCLOREX 2%	neředěný	1 min				ABTMV	chlorhexidin, izopropylalkohol			
JODISOL	neředěný	do zaschnutí				ABTMV	jod, alkohol			
KODAN® FORTE bezbarvý/barevný	neředěný	15 s				A(B)(V)	směs alkoholu			
		1 min				A(B)TM(V)				
SEPTODERM OP	neředěný	1 min				ABTMV	etanol, isopropanol, KAS			
SEPTODERM SPRAY	neředěný	15-30 s				A(V)-A(B)(V)	etanol, isopropanol, KAS			
Sliznice	před zákrokem nebo vyšetřením	výplachy ústní dutiny	BRAUNOL, BETADINE	dle výrobce	dle výrobce	ABTMV	PVP jod			
			OCTENISEPT	neředěný	30 s	A(B)	octenidine dihydrochloride			
			OCTENIDOL MD	neředěný	30 s	antibakteriální	octenidine dihydrochloride			
			SKINSEPT MUCOSA	neředěný	1 min	A(B)V	chlorhexidin			
			DISCLEEN EXTRA	1%	15 min	A(B)TMV	KAS, amin			
			GIGASEPT AF FORTE	1-2%	30-15 min	A(B)TM(V)	KAS, amin, fenoxetanol			
			CHIROSAN PLUS	1%	15 min	A(B)TM(V)	generovaná PAA, KAS			
Čištění a dezinfekce nástrojů a pomůcek	čištění a dekontaminace chirurgických a vyšetřovacích nástrojů a pomůcek, předmětů z gumy, skla, kovu, porcelánu a plastů	vložit rozložené anebo rozmontované do pracovního roztoku, dodržet expoziční čas, opláchnout pitnou ev. demineralizovanou vodou	PROCURA CL	0,5%	30 min	ABTMV	chlór			
			PROCURA ENDO STAR	3%	15 min	ABCTMV	amin, biguanid			
			SEKUSEPT AKTIV	2%	15 min	ABCTMV	generovaná PAA, KAS			
			DESAM EXTRA	1%	30 min	A(B)TMV rotavirus	KAS, amin			
			DESAM OX	1%	30 min	A(B)TM(V)	kyslík			
			DESAM PRIM	3%	30 min	ABTMV	chlór			
			CHLORAMIX DT	1 tb/4-5 l vody	15 min	ABTMV	chlór			
Dezinfekce termolabilních nástrojů a pomůcek a vyšší stupeň dezinfekce	po fázi čištění a dezinfekci	po dekontaminaci a vysušení zcela ponořit do pracovního roztoku, po expozici opláchnout demineralizovanou vodou	PROCURA PE	0,3%	15-30 min	ABTMV-ABCTMV	kys. peroctová			
			CHLORAMIX DT	1 tb/1,5 l vody	15 min	ABTMV	chlór			
			Odmývání dezinfekce - vždy při střídání účinné látky					ProFLOOR MACH - strojové mytí ProFLOOR BASIC - ruční mytí		
			Systém wipex safe and easy - čištění a dezinfekce malých ploch otřením	na dezinfekci malých ploch a při náhodné kontaminaci povrchů, inkubátoru	nafedlit koncentrát do 3 litru vody, bez ředění použít desprej či desprej sensitive 2 litry, pomocí utěrky setřít povrch max 2 m², doba použitelnosti utěrek v zásobníku je 28 dní	DESAM EXTRA	1%	30 min	A(B)TMV	KAS, amin
						DESAM OX	2%	5 min	A(B)V	kyslík
						DESPREJ	neředěný	1 min	ABTMV	alkohol, KAS
						DESPREJ SENSITIVE	neředěný	5 min	A(B)TMV	KAS, amin, biguanid
Čištění a dezinfekce malých ploch (materiál necitlivý na alkohol) postříkem či otřením	na dezinfekci malých ploch a při náhodné kontaminaci povrchů	rozprašovačem nastříkat na kontaminovaný povrch či setřít ubrouskem	TERRALIN PROTECT	2%	15 min	A(B)V	KAS, amin			
			DESAM WIPES	neředěný	1 min	ABTMV	alkohol			
			DESAM WIPES SOFT	neředěný	5 min	A(B)TMV	KAS, amin, biguanid			
			DESPREJ	neředěný	1 min	ABTMV	alkohol, KAS			
Dezinfekce otlivých povrchů - monitoru, inkubátoru, klávesnic, LCD panelu atd.			DESPREJ SENSITIVE	neředěný	5 min	A(B)TMV	KAS, amin, biguanid			
			DESAM EXTRA	1%	30 min	A(B)TMV	KAS, amin			
			DESAM PRIM	3%	30 min	ABTMV	chlór			
			DESAM PRIM	5%	30 min	ABCTMV	chlór			
Nádoby, přístroje, lékovky	po použití	omýt připraveným roztokem, oplach pitnou vodou	PERSTERIL	0,5%	15 min	ABCTMV	kys. peroctová			
			PROCURA PE	0,3%	30 min	ABCTMV	kys. peroctová			
			DESAM OX	2%	5 min	A(B)(V)	kyslík			
			CHIROSAN PLUS	2%	5 min	A(B)TM(V)	generovaná PAA, KAS			
Epidemiologicky závažná situace, cílené potlačení infekce (TBC, klistridiové infekce) závěrečná dezinfekce	plochy a povrchy navlhčit dezinfekčním roztokem		SAVAGRO A+	0,25-0,5%	20-30 min	AV	chlórnan sodný, hydroxid sodný			
			kys. amidosulfonová (čistič)	do 3%	20 min	-	-			
			Rehabilitační vany					po použití		
			Potrubní systémy					1x týdně 1x za 3 týdny		
A		baktericidní (včetně MRSA)								
(V)		levurocidní (Candida albicans)								
(B)		omezená virucidní účinnost (na obalené viry BVDV, Vaccinia virus včetně HBV, HIV, HCV)								
B		plná virucidní účinnost (adenovirus, poliovirus, norovirus)								
C		sporicidní								
T, M		tuberkulocidní a mykobaktericidní								
V		fungicidní (Aspergillus brasiliensis)								

Ved použitím si vždy přečtěte etiketu a informační leták přípravku. Při práci dodržujte zásady ochrany zdraví a bezpečnosti, používejte OOPP. Dezinfekční roztok připravte rozpuštěním přesně odměřeného množství dezinfekčního přípravku v přesně odměřeném množství vody o teplotě přibližně 20-25°C. Koncentrát vždy lýt/sypat do odměřeného množství vody. Do roztoku nepřidávat žádné další čisticí prostředky.